



*Servizio Farmaceutico
Ufficio di Farmacovigilanza
Via Medaglie D'Oro 10 – 14
Tel. 0984.893214
Fax 0984.893216
farmacovigilanzacs@asp.cosenza.it*

Rif. Prat. N. 64 /UAF del 19.11.2010

Direzione Sanitaria
A.S.P. di Cosenza

Al Direttore Sanitario
P.O. Beato Angelo ACRI

Al Direttore Sanitario
P.O. San Giovanni in Fiore

Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Al Direttore Dipartimento di Prevenzione

Al Direttore Dipartimento Materno-Infantile

Al Direttore U.O.C. Medicina Specialistica

Al Direttore U.O.C. Medicina di Base

Al Direttore SUEM

Farmacia Territoriale
Rende
San Giovanni in Fiore

Farmacia Interna P.O.
ACRI/S. Marco Arg.
San Giovanni in Fiore

Ai Direttori Sanitari
Case di Cura

Direttore Sanitario INRCA
LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione inserimento/modifiche Note AIFA

Con Determinazione AIFA del 2 novembre u.s. pubblicata in G.U. n.265 del 12.11.2010, è stata inserita la **nota AIFA 91**, relativa all'utilizzo del medicinale Febuxostat a carico del SSN per i pazienti affetti da iperuricemia cronica per come specificato nella nota stessa che di seguito si riporta.

NOTA 91

<ul style="list-style-type: none">• Febuxostat	<p><i>La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Trattamento dell'iperuricemia cronica con anamnesi o presenza di tofi e/o di artrite gottosa i soggetti che non siano adeguatamente controllati con allopurinolo o siano ad esso intolleranti
--	---

Con Determinazione AIFA del 29.07.2010, pubblicata in G.U. n. 269 del 18.11.2010 è stata apportata **modifica** alla **nota 36** di cui alla determinazione del 4 gennaio 2007, si riporta di seguito il testo della nota modificato.

NOTA 36

<p>Ormoni androgeni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Testosterone	<p><i>La prescrizione a carico del SS, su diagnosi e Piano Terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti opzioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Ipogonadismi maschili primitivi e secondari caratterizzati da ridotte concentrazioni di testosterone totale (< 12 nmoli/L o 350 ng/dL) in presenza di sintomi tipici (riduzione del desiderio e potenza sessuale, osteoporosi, riduzione forza muscolare, obesità viscerale, alterazioni del tono dell'umore).
---	---

Certi della Loro Collaborazione nel garantire la massima diffusione della presente nota, si porgono distinti saluti

Il Direttore f.f.
U.O.C. Servizio Farmaceutico
Dott. Giuseppe Valente

Il Responsabile
Ufficio Aziendale di Farmacovigilanza
Dott.ssa Brunella Piro